

COUNTY OF SUFFOLK



EDWARD P. ROMAINÉ
SUFFOLK COUNTY EXECUTIVE

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES

GREGSON PIGOTT, MD, MPH
Commissioner

Dear Parents and Staff,

December 2, 2025

Please be advised that there has been a positive case of Pertussis at Wilson Technological Center. Pertussis is a respiratory illness also known as “whooping cough.” This is a highly contagious bacterial disease that is spread through the air by cough from an infected individual. Children and adults may develop Pertussis even if they are up to date with their vaccinations, as immunity to Pertussis may lessen over time. Remaining up to date on vaccination against Pertussis, however, remains the best defense to prevent illness.

There are three stages of Pertussis infection:

- Stage 1: Mild upper respiratory symptoms including low-grade fever, runny nose, sneezing, and mild, occasional cough.
- Stage 2: Spasmodic coughing episodes, often at night, sometimes followed by long whooping sound and possible facial color changes or vomiting after coughing episodes. Does not appear ill between attacks.
- Stage 3: Although the infection is not contagious after appropriate antibiotic treatment or 21 days from start of cough, coughing episodes may persist for weeks to months (“cough of 100 days”).

Once a susceptible individual is exposed to Pertussis, it may take up to 21 days for symptoms to develop. **If you observe these symptoms in your child/self, contact your health care provider and request a test for Pertussis with a special nasal-throat swab.** This test is performed at either the doctor’s office or hospital emergency room. Blood testing is not confirmatory for this disease. **Early treatment with the appropriate antibiotic for a symptomatic individual will eliminate disease transmission and may reduce disease severity.**

Antibiotic prophylaxis (preventive treatment) is recommended for high-risk asymptomatic contacts (not currently showing symptoms) including all household contacts, as well as any other close contacts who are infants, women in their third trimester of pregnancy, or immunocompromised persons at risk for severe disease. Pertussis disease is particularly dangerous to infants who are not fully immunized. **Prophylaxis is not generally recommended for school contacts,** but if you or your child fall into one of these high-risk categories and may have been in close contact with the ill student, please speak with your healthcare provider.

If you or your child’s health care provider suspects a diagnosis of Pertussis, orders testing and prescribes antibiotics, you or your child should remain home until five days of the antibiotic has been completed.

For additional information on Pertussis, visit the Centers for Disease Control and Prevention website at www.cdc.gov. Parents or their physician may contact the Division of Disease Control at 631-854-0333 if they have any questions.

Sincerely,

Cynthia Friedman, M.D., Director of Public Health
Suffolk County Department of Health Services



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

DIVISION OF PUBLIC HEALTH – BUREAU OF EPIDEMIOLOGY AND DISEASE CONTROL
3500 Sunrise Highway, Ste. 124, PO Box 9006, Great River, NY 11739-9006
Phone (631) 854-0333 | Fax (631) 854-0346

COUNTY OF SUFFOLK



EDWARD P. ROMAINÉ
SUFFOLK COUNTY EXECUTIVE

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES

GREGSON PIGOTT, MD, MPH
Commissioner

Queridos padres y personal,

2 Diciembre 2025

Tenga en cuenta que ha habido un caso de Tosferina (Pertussis) en Wilson Technological Center. La Tosferina es una enfermedad respiratoria también conocida como “pertussis” o whooping cough. Esta es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de la tos de una persona infectada. Los niños y los adultos pueden desarrollar tosferina incluso si están al día con sus vacunas, ya que la inmunidad a la tosferina puede disminuir con el tiempo. Sin embargo, mantenerse al día con la vacunación contra la tosferina sigue siendo la mejor defensa para prevenir enfermedades.

Hay tres etapas de la infección:

- Etapa 1: Síntomas leves de las vías respiratorias superiores, que incluyen fiebre leve, secreción nasal, estornudos y tos leve ocasional.
- Etapa 2: episodios de tos espasmódica, a menudo por la noche, a veces seguidos de un silbido prolongado y posibles cambios de color facial o vómitos después de los episodios de tos. No parece enfermo entre ataques.
- Etapa 3: Aunque la infección no es contagiosa después del tratamiento antibiótico apropiado o 21 días desde el inicio de la tos, los episodios de tos pueden persistir durante semanas o meses (“tos de 100 días”).

Una vez que una persona susceptible se expone a la Tosferina, los síntomas pueden tardar hasta 21 días en desarrollarse. **Si observa estos síntomas en su hijo/a, comuníquese con su proveedor de atención médica y solicite una prueba de tosferina con un hisopo especial de garganta nasal.** Esta prueba se realiza en el consultorio del médico o en la sala de emergencias del hospital. Los análisis de sangre no son confirmatorios de esta enfermedad. **El tratamiento temprano con el antibiótico apropiado para un individuo sintomático eliminará la transmisión de la enfermedad y puede reducir la gravedad de la enfermedad.**

Se recomienda tratamiento preventivo para contactos sin síntomas de alto riesgo, incluidos todos los contactos domésticos, así como cualquier otro contacto cercano. La enfermedad de la tosferina es particularmente peligrosa para los bebés que no están completamente inmunizados. Se recomienda que mujeres sean vacunadas en cada embarazo. **Por lo general, no se recomienda tratamiento preventivo para los contactos escolares, pero si usted o su hijo se encuentran en una de estas categorías de alto riesgo y pueden haber estado en contacto cercano con el estudiante enfermo, hable con su proveedor de atención médica. Si su proveedor de atención médica o el de su hijo sospecha un diagnóstico de tosferina, ordena pruebas y prescribe antibióticos, usted o su hijo deben permanecer en casa hasta que se hayan completado cinco días de tratamiento con antibióticos.**

Para obtener información adicional sobre la tosferina, visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en www.cdc.gov. Los padres o su médico pueden comunicarse con la División de Control de Enfermedades al 631-854-0333 si tienen alguna pregunta.

Cynthia Friedman, M.D.,
Directora de Salud Pública
Suffolk County Department of Health Service

Cynthia Friedman, MD



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

DIVISION OF PUBLIC HEALTH – BUREAU OF EPIDEMIOLOGY AND DISEASE CONTROL
3500 Sunrise Highway, Ste. 124, PO Box 9006, Great River, NY 11739-9006
Phone (631) 854-0333 | Fax (631) 854-0346